

非ホジキンリンパ腫

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
R±CHOP	リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注4-8時間	d1	21日
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	点滴静注 30分	d2	
	アドリアシン	ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注 30分	d2	
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注 3時間	d2	
	プレドニン	プレドニゾロン	100 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d2-6	
R±THP-COP	リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注4-8時間	d1	21日
	オンコビン	ビンクリスチン	1 mg/m ²	点滴静注 30分	d2	
	ピノルビン	ピラルビシン	40 mg/m ²	点滴静注 30分	d2	
	エンドキサン	シクロホスファミド	650 mg/m ²	点滴静注 3時間	d2	
	プレドニン	プレドニゾロン	40mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d2-6	
Pola+R-CHP	リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注4-8時間	d1	21日
	ポライビー	ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分)	d2	
	アドリアシン	ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注 30分	d3	
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注 3時間	d3	
	プレドニン	プレドニゾロン	100 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d3-7	
RB	リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注4-8時間	d1	28日
	トリアキシン	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注 10分 または 1時間	d2-3	
リツキシマブ単剤	リツキシマブBS	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注4-8時間	d1	7日
GB(初回)	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	点滴静注4-6時間	d1,8,15	28日
	トリアキシン	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注 10分 または 1時間	d2-3	
GB(2回目以降)	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	点滴静注4時間	d1	28日
	トリアキシン	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注 10分 または 1時間	d2-3	
ガザイバ単剤	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000mg/body	点滴静注4時間	d1	56日
アドセトリス	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg	点滴静注 1時間	d1	21日
A+CHP	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg	点滴静注 1時間	d1	21日
	アドリアシン	ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注 30分	d2	
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注 3時間	d2	
	プレドニン	プレドニゾロン	100 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d2-6	
イストダックス	イストダックス	ロミデプシン	14 mg/m ²	点滴静注 4時間	d1,8,15	28日
エプキンリ (1サイクル目)	エプキンリ	エプコリタマブ	d1 0.16mg d8 0.8mg d15・22 48mg	皮下注	d1,8,15,22	28日
エプキンリ (2,3サイクル目)	エプキンリ	エプコリタマブ	48 mg/body	皮下注	d1,8,15,22	28日
エプキンリ (4-9サイクル目)	エプキンリ	エプコリタマブ	48 mg/body	皮下注	d1,15	28日
エプキンリ (10サイクル目以降)	エプキンリ	エプコリタマブ	48 mg/body	皮下注	d1	28日

ホジキンリンパ腫

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ABVd	ダカルバジン	ダカルバジン	250 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,15	28日
	アドリアシン	ドキシソルビシン	25 mg/m ²	点滴静注 30分		
	エクザール	ビンブラスチン	6 mg/m ²	点滴静注 30分		
	ブレオ	ブレオマイシン	9 mg/m ²	点滴静注 30分		
A-Avd	ダカルバジン	ダカルバジン	250 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,15	28日
	アドリアシン	ドキシソルビシン	25 mg/m ²	点滴静注 30分		
	エクザール	ビンブラスチン	6 mg/m ²	点滴静注 30分		
	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.2 mg/kg	点滴静注 1時間		
アドセトリス	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg	点滴静注 1時間	d1	21日

骨髄異形成症候群

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ビダーザ5days	アザシチジン	アザシチジン	75 mg/m ²	点滴静注 10分 または 皮下注	d1-5	28日

多発性骨髄腫

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
Vd	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	d1,4,8,11	21日
	レナデックス	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	d1,2,4,5,8,9,11,12	
VRD	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	d1,4,8,11	21日
	レナデックス	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	d1,4,8,11	
	レナリドミド	レナリドミド	25 mg/body	内服	d1-14	
VPD	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	d1,4,8,11	21日
	レナデックス	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	d1,4,8,11	
	ポマリスト	ポマリドミド	4 mg/body	内服	d1-14	
Kd	カイプロリス	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,2,8,9,15,16	28日
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,2,8,9,15,16,22,23	
	※カイプロリス 1サイクル目day1・2の投与量は20mg/m ²					
Kd 週1回投与	カイプロリス	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,8,15	28日
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,8,15,22	
	※カイプロリス 1サイクル目day1の投与量は20mg/m ²					
KRd	カイプロリス	カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	点滴静注 10分	d1,2,8,9,15,16	28日
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,2,8,9,15,16,22,23	
	レナリドミド	レナリドミド	25 mg/body	内服	d1-21	
	※カイプロリス 1サイクル目day1・2の投与量は20mg/m ²					
DVd	ダラキューロ	ダラツムマブ ボルヒアルロニ ダーゼアルファ	15 mL/body	皮下注	d1,8,15	21日
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	d1,4,8,11	
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,4,8,11,15	

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
DRd	ダラキューロ	ダラツムマブ ボルヒアルロニ ダーゼアルファ	15 mL/body	皮下注	d1,8,15,22	28日
	レナリドミド	レナリドミド	25 mg/body	内服	d1-21	
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,8,15,22	
ERd	エムプリシティ	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注 3時間	d1,8,15,22	28日
	レナデックス	デキサメタゾン	28 mg/body	内服	d1,8,15,22	
	レナリドミド	レナリドミド	25 mg/body	内服	d1-21	
	※エムプリシティ 3サイクル目以降はd1,15に投与					
EPd (1,2サイクル目)	エムプリシティ	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注 3時間	d1,8,15,22	28日
	レナデックス	デキサメタゾン	28 mg/body	内服	d1,8,15,22	
	ポマリスト	ポマリドミド	25 mg/body	内服	d1-21	
EPd (3サイクル目以降)	エムプリシティ	エロツズマブ	20 mg/kg	点滴静注 3時間	d1	28日
	レナデックス	デキサメタゾン	28 mg/body	内服	d1,8,15,22	
	ポマリスト	ポマリドミド	4 mg/body	内服	d1-21	
IsaPd	サークリサ	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注 3時間	d1,8,15,22	28日
	デキサート	デキサメタゾン	40 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,8,15,22	
	ポマリスト	ポマリドミド	4 mg/body	内服	d1-21	
	※サークリサ 2サイクル目以降はd1,15に投与					
IsaKd	サークリサ	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注 3時間	d1,8,15,22	28日
	カイクロリス	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	点滴静注 30分	d1,2,8,9,15,16	
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,2,8,9,15,16	
	※カイクロリス 1サイクル目 day1・2の投与量は20mg/m ² ※サークリサ 2サイクル目以降はd1,15に投与					
Isa+d	サークリサ	イサツキシマブ	20 mg/kg	点滴静注 3時間	d1,8,15,22	28日
	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注 30分 または 内服	d1,2,8,9,15,16	
	※サークリサ 2サイクル目以降はd1,15に投与					

骨髄増殖性疾患

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
サイメリン	サイメリン	ラニムスチン	50mg/body 又は 100mg/body	点滴静注 30分	d1	28日