

頭頸部がん

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
セツキシマブ単剤	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回 400mg/m ²)	点滴静注 1時間 (初回 2時間)	d1	7日
ニボルマブ(2週間隔)	オブジーボ	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注 30分	d1	14日
ニボルマブ(4週間隔)	オブジーボ	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注 30分	d1	28日
Cmab+PTX	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回 400mg/m ²)	点滴静注 1時間 (初回 2時間)	d1	7日
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注 1時間	d1	
Cmab+CBDCA+PTX	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回 400mg/m ²)	点滴静注 1時間 (初回 2時間)	d1,8,15	21日
	パクリタキセル	パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注 1時間	d1,8	
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=2.5	点滴静注 1時間	d1,8	
トラスツズマブ+DTX	ハーセプチン	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日
	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注 1時間	d1	

悪性黒色腫

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ニボルマブ+イピリムマブ	オブジーボ	ニボルマブ	80 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
	ヤーポイ	イピリムマブ	3 mg/kg	点滴静注 90分	d1	

MSI-High固形がん

レジメン名称	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール
ペムブロリズマブ(3週間隔)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
ペムブロリズマブ(6週間隔)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注 30分	d1	42日